

**AANVRAAG VAN OPVOLGING BIJ HET KIND BESMET MET HET HIV**

- Virale lading HIV-1                       ➤ Genotype RT - PR   
 ➤ Virale lading HIV-2                       ➤ Genotype Integrase   
    ➤ Tropisme (Genotype)

(Versie 03/2012)

**2 TUBES EDTA ( ten minste 2 ml)**

*Niet gecentrifugeerde tubes moeten binnen de 4 uur het laboratorium bereiken **of**  
De tubes worden afgedraaid binnen het uur en ingevroren plasma bereikt het laboratorium tussen 9 en 15 uur.*

*Het staal mag niet via de Centre de Gestion des Echantillons (CGL) van de Cliniques Universitaires Saint-Luc afgeleverd worden.*

Staal afgenomen op :                      om                      u.                      ; ingevroren op                      om                      u.

- Reden van aanvraag :
- Vóór behandeling
  - Opvolging zonder behandeling
  - Opvolging van behandeling
  - Verandering van behandeling
  - .....

Recente vaccinatie of ernstige infectie binnen de maand :                      O JA                      O NEE

Patiënt opgenomen in een studie en identificatie : .....

Klinische evolutie : stationnair                       verergering                       verbetering

Klinisch stadium : A                      B                      C                      op (datum)

CD4/µl :                      resultaat van ...../...../.....

Medicatie van patiënt :

KLASSE	MEDICATIE	BEGIN	EINDE	OPMERKING
NRTI, NtRTI	AZT	Retrovir®		
	ddI	Videx®		
	3TC	Epivir®		
	d4T	Zerit®		
	ABC	Ziagen®		
	TDF	Viread®		
	FTC	Emtriva®		
	AZT+3TC	Combivir®		
	AZT+3TC+ABC	Trizivir®		
	3TC+ABC	Kivexa®		
	FTC+TDF	Truvada®		
	NNRTI	NVP	Viramune®	
EFV		Stocrin®		
ETV (TMC-125)		Intelence®		
FTC+TDF+EFV		Atripla®		
PI	IDV	Crixivan®		
	NFV	Viracept®		
	RTV	Norvir®		
	SQV	Invirase®		
	LPV/r	Kaletra®		
	Fos-APV ou FPV	Telzir®		
	ATV	Reyataz®		
	TPV	Aptivus®		
EI	DRV	Prezista®		
	ENF (T20)	Fuzeon®		
INI	MVC	Celsentri®		
	RAL	Iseenstress®		